

注意)「内服薬 経管投与ハンドブック」ならびに「メーカー判断」より主に作成しています。当院薬剤部ではチューブ閉塞などに関しての責任を負いかねます。簡易懸濁法手順は別紙を参照してください。

可(○)はそのままの状態が可能です
 粉碎後可(△)は分包紙のうえから叩いています。
 不可(×)は簡易懸濁法が可能というデータが現在のところありません。
 H25.4.19作製

名称	検索用(○可, △粉碎後可, ×不可)	備考
25mgアリナミン糖衣錠	△	苦味
2mgセルシン錠	○	
5-FU錠100協和 100mg	×	
5-FU錠50協和 50mg	×	
5mgセルシン錠	○	
EPLカプセル250mg	×	チューブにこびりつく
K.C.L.エリキシル(0.1g/ml)	○	
1-メントールOY	○	
1メントール「日医工」	○	
MSコンチン錠10mg	×	
MSコンチン錠30mg	×	
PL配合顆粒1g	○	
SG配合顆粒(1g/包)	○	フラッシュは多めの水が望ましい
アーガメイト20%ゼリー25g	○	別容器にとり、お湯を加えスプーンでつぶす
アーチスト錠1.25mg	○	
アーチスト錠10mg	○	
アーチスト錠2.5mg	○	
アーテン錠(2mg)	○	苦味
アイトロール錠20mg	○	
アイビーティカプセル100	○	
アイビーティカプセル5%(50mg/g)	○	
アキネトン錠1mg	○	通過悪い、洗浄多めに
アクトス錠15	○	
アクトス錠30 30mg	○	
アクトネル錠17.5mg	×	上記参照
アクトネル錠2.5mg	×	座位30分以上保持できない人には投与しない
アサコール錠400mg	○	腸痙ならOK
アザニン錠50mg	○	被ばく注意
アザルフィンEN錠500mg	△	腸痙ならOK
アジノン錠150mg	○	
アジノン錠75mg	○	
アジヤストAコーワ錠40mg	×	
アジルバ(20)	△	粉碎後は遮光保存が望ましい
アストリックドライシロップ80%	○	
アストリックドライシロップ80%(800mg/g)	○	
アスハラ-CA錠200	△	吸湿性
アスハラカリウム錠300mg	×	
アスピリン	○	
アスピリン「日医工」	×	メーカーデータなし
アスヘノカプセル10 10mg	○	局麻作用
アスヘノカプセル20	○	局麻作用
アスヘリンシロップ(5mg/ml)	○	
アスヘリンシロップ2%(20mg/g)	○	
アスヘリン錠20 20mg	○	
アセチルシステイン内用液17.6%「シヨウ」(20)	○	
アセチルシステイン錠200 200mg	○	苦味
アセフチン錠1mg	○	マクロゴール6000含有
アタフチノール錠5mg	×	
アタラートCR錠10mg	×	徐放性
アタラートCR錠20mg	×	体内動態
アタラートCR錠40mg	×	徐放性
アタラートL錠10mg	×	徐放性
アタラートL錠20mg	×	体内動態
アタラートカプセル10mg	×	体内動態
アタラックス-Pカプセル25mg	○	多めの水で洗浄
アタラックス錠10mg	×	苦味
アテホスコワ腸溶錠60	×	腸溶性
アテレック錠10	○	マクロゴール6000含有
アテレック錠5 5mg	○	マクロゴール6000含有
アトルピン原末	○	通過性やや悪い
アトナ錠30mg	○	
アナフアニール錠10mg	△	マクロゴール6000含有
アヘロックス錠400mg	○	
アボロン錠0.25mg	×	メーカーデータなし
アボルブカプセル0.5mg	△	脱カプでOK
アマリール0.5mg錠	○	
アマリール1mg錠	○	
アミサリン錠125mg	×	吸湿性、潮解、マクロゴール6000含有
アミティーザカプセル2.4μg	×	軟カプセル。中身が液体で粉碎は不可。また水と混ざりにくい。
アミルハンEN配合散50g(50g/包)	○	
アミュー配合顆粒 2.5g	○	甘味
アモキシカプセル10mg	○	多めの水で洗浄
アモハン錠10 10mg	○	多めの水で洗浄 苦味
アモハン錠7.5	○	多めの水で洗浄 苦味
アラハ錠10mg	×	データなし
アラハ錠20mg	×	データなし
アリセフトD錠 10 mg	○	
アリセフトD錠 3 mg	○	
アリセフトD錠 5 mg	○	
アリセフト細粒(5mg/g)	○	
アリミックス錠1mg	○	被ばく注意
アルサルミン細粒90%(1g/包)	○	
アルサルミン内用液10%(10ml/包) 10ml	○	
アルダクトンA錠25mg	○	

アルタットカフセル75	×	
アルドメト錠250 250mg	○	多めの水で少しずつ洗浄
アルファロールカフセル0.25 μg	○	カプセル外皮残るが通過
アルファロールカフセル0.5 μg	○	外皮残るが通過
アルファロールカフセル1 μg	○	カプセル外皮残るが通過
アルホ錠200mg	○	苦味
アルマール錠10	○	マクロゴール6000含有 10分以上でOK 苦味
アルマール錠5 5mg	○	マクロゴール6000含有 5分くらい長めでOK 苦味
アルロイトG内用液	○	粘性、水で薄めると薬効低下。当院では前後フラッシュでチューブ通過にて○
アレキサール錠5mg	○	苦味
アレグラ錠30mg	○	最少14Fr 懸濁後の浮遊物大
アレグラ錠60mg	○	最少14Fr 懸濁後の浮遊物大
アレジオンライソップ1%	×	メーカーデータなし
アレジオン錠20 20mg	○	マクロゴール6000含有 苦味
アレビア錠100mg	○	
アレロック錠5	○	マクロゴール6000含有 苦味
アロゼン顆粒(0.5g/包)	○	通過性悪い、苦味
アロチノロール錠10mg	×	粉碎不可
アロチノロール錠5mg	×	粉碎不可
アンカロン錠100	○	多めの水で洗浄
アンジュ28錠	×	メーカーデータなし
アンナカ	○	
アンブラーグ錠100mg	△	多めの水で洗浄 苦味
イーケブラ錠500mg	△	苦味
イーシートハール配合錠	○	
イクザレルト錠15mg	×	メーカーよりしないでほしいと。
イザロン錠100mg	○	
イザロン顆粒(500mg/g)	○	
イスコチン錠100mg	○	配合変化注意
イソバト	○	初め甘みと酸味あり、のちにやや苦味苦香あり
イソバトシロップ70%分包30mL	○	初め甘みと酸味あり、のちにやや苦味苦香あり
イトリールカフセル50	○	最少16Fr、脱カフ後すぐ注入で14Fr通過
イミグラン錠50	○	
イムラン錠50mg	○	多めの水で洗浄 被曝に注意
イメントカフセルセット(3日)	○	カプセル外皮残るが通過
イリホー錠5 μg	○	
イルヘタン錠100mg	○	
イレッサ錠250 250mg	△	
インタール細粒10%(100mg/g)	○	易溶性 わずかに苦味
インテパンSP25	○	酸・アルカリで分解 崩壊時間短く
インデラル錠10mg	○	洗浄多め 固まりあるが通過 苦味
インフリーカフセル100mg	○	
ウェールナラ配合錠	×	データなし、
ウテミン錠5mg	○	
ウフレチド錠5mg	○	
ウラリット-U配合散(1g/包)	△	
ウラリット配合錠	△	
ウルグートカフセル200mg	○	
ウルソ錠100mg	○	苦味
ウルソ錠50mg	○	苦味
ウロカル錠225mg	○	
エースコール錠2mg	○	
エカート配合錠HD	○	
エカート配合錠LD	○	
エクス錠50mg	○	
エクシエイト懸濁用錠125mg	○	粒子が大きく詰まる可能性がある
エクシエイト懸濁用錠500mg	○	粒子が大きく詰まる可能性がある
エクセグラン錠100mg	○	苦味
エクセラセ配合カプセル	×	腸溶性顆粒+粉末 シリンジから出ない
エクセラセ配合顆粒	×	シリンジに入らない
エサンブール錠250mg	×	
エストラサイトカフセル156.7mg	○	被爆注意
エストリール錠1mg(持田)	○	
エスベリベン錠	×	昇華性の成分含むため。特異なおいある
エックスフォージ配合錠	○	他院データ参考
エティロールカフセル0.75 μg	×	大正:外皮残る 中外:、チューブに付着
エハステルOD錠10mg	○	
エハステルS600 600mg	○	
エハステルS900	○	
エハミール錠1.0 1mg	○	
エヒスタ錠60mg	○	
エヒナシオン錠20 20mg	○	苦味
エビフロスタット配合錠DB	×	マクロゴール6000含有
エビリファイOD錠3mg	○	
エヒレオプチマル散50%(500mg/g)	○	
エフビーOD錠2.5	○	
エフランチルカフセル15mg	○	最少14Fr 懸濁後の浮遊物大
エフランチルカフセル30mg	○	洗浄やや多めに 崩壊時間短く 苦味
エホチール錠5mg	○	苦味
エリスパン錠0.25mg	○	
エリスロシンドライソップW20%(200mg/g)	○	
エリスロシン錠200mg	○	腸痙ならOK
エレンタール配合内用剤80g/包	○	
エンシュア・H250ml	○	
エンシュア・リキッド 250mL	○	
エンシュア・リキッド 250mLコーヒー味	○	
エンシュア・リキッド 250mLストロベリー味	○	
エンシュア・リキッド 250mLバナナ味	○	
エンドキサン錠50mg	×	高温で不安定
エンピナー・P錠18000	△	マクロゴール6000含有
オイグルコン錠1.25mg	○	
オイグルコン錠2.5mg	○	
オーグメンチン配合錠250RS 375mg	×	
オーグル錠100mg	△	マクロゴール6000含有

オキシコチン錠10mg	×	
オキシコチン錠40mg	×	
オキシコチン錠5mg	×	
オキノーム散2.5mg	○	
オキノーム散5mg	○	
オセックス小児用15%	○	55℃ 10分 メーカーより
オセックス錠150	○	
オタイン錠125mg	×	被曝あり
オノンカフセル112.5mg	○	
オノドライシロップ(100mg/g)	○	
オハルモン錠5μg	○	
オフソ内服液5mg 2.5mL	○	
オムラール錠10 10mg	△	腸溶性 腸までならOK
オムラール錠20	△	腸溶性ならOK 苦味
オラセフ錠250mg	○	苦味
オルメテック錠10mg	○	
オルメテック錠20mg	○	
オルメテック錠40mg	○	
カイトリル錠2mg	○	
カスコト ロップ 内用液2%(20mg/ml)	○	
カスコン錠40mg	○	多めの水で洗浄
カスター-D錠10mg	○	
カスター-D錠20mg	○	
カスター散2%	○	
カストローム顆粒66.7%1.5g	×	
カストロクアイン経口・注腸用	○	
カスモチン錠5mg	○	
カスロン・OD錠2mg	○	
カスロン・OD錠4mg	○	
カゾテックス錠80mg	×	被曝注意
カデュエット配合錠4番	○	
カナン錠50mg	△	マクロゴール6000含有 苦味
カナマイシンカフセル250mg	○	
カバサル錠1	○	
カバサル錠0.25mg	○	
カバベン錠200mg	×	懸濁しきらない
カバベン錠300mg	△	懸濁するまで放置
カランターセ 散50%	○	酵素製剤であり、50℃以上では失活するため、温度に注意すること
カリメート散5g	○	すぐに注入する
カルスロット錠10	○	
カルスロット錠20	○	
カルテナリン錠1mg	○	
カルテナリン錠4mg	○	
カルナクリンカフセル25	×	シリンジから出ない
カルナクリン錠25 25単位	×	55℃で失活 腸溶性
カルナクリン錠50	○	
カルプロック錠16mg	△	
カルプロック錠8mg	△	味なし
カロナール細粒20%(200mg/g)	○	
カロナール錠200	○	
キシロカインビスカス2%	○	
キネタック錠50mg	○	
キプレスチアフル錠5mg	○	
キプレス細粒4mg/包	×	湿度、光に不安定である
キプレス錠10mg	×	湿度
キヤハロン錠10mg	○	
キヤハロン錠5mg	○	
グラクティブ錠100mg	○	
グラケカフセル15mg	○	多めの水で洗浄
クワシエよく苡仁湯エキス細粒2g	○	
クワシエ温清飲エキス細粒3.0g	○	
クワシエ加味帰脾湯エキス細粒3.75g	○	
クワシエ加味逍遙散料エキス細粒3.0g	○	
クワシエ葛根湯エキス細粒3.75g	○	
クワシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒3.0g	○	
クワシエ桂枝人参湯エキス細粒3.0g	○	
クワシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒2.0g	○	
クワシエ五苓散料エキス細粒3.0g	○	
クワシエ四物湯エキス細粒(3g/包)	○	
クワシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒3.0g	○	
クワシエ柴苓湯エキス細粒4.05g	○	
クワシエ十全大補湯エキス細粒3.75g	○	
クワシエ十味敗毒湯エキス錠3錠/包	○	
クワシエ小柴胡湯エキス細粒3.0g	○	
クワシエ小青竜湯エキス細粒2.0g	○	
クワシエ神祕湯エキス細粒3.0g	○	
クワシエ人参養栄湯エキス細粒2.5g	○	
クワシエ人参養栄湯エキス細粒3.75g	○	
クワシエ大柴胡湯エキス細粒3.0g	○	
クワシエ猪苓湯エキス細粒3.0g	○	
クワシエ桃核承気湯エキス錠(3錠/包)	○	
クワシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	○	
クワシエ当帰芍薬散料エキス細粒3.0g	○	
クワシエ八味地黄丸料エキス細粒3.0g	○	
クワシエ半夏厚朴湯エキス細粒3.0g	○	
クワシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒2.5g	○	
クワシエ半夏瀉心湯エキス細粒3.0g	○	
クワシエ補中益気湯エキス細粒2.5g	○	
クワシエ補中益気湯エキス細粒3.75g	○	
クワシエ防風通聖散エキス錠3錠/包	○	
クワシエ防風通聖散料エキス細粒2.5g	○	
クワシエ防己黄耆湯エキス細粒2.5g	○	
クワシエ麻黄湯エキス細粒2g	○	
クワシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒3.7	○	

クラシエ香桂朮甘湯エキス細粒3.0g	○	
クラシエ六君子湯エキス細粒3.0g J	○	
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒3.0g	○	
クラビット錠250mg	△	多めの水で洗浄
クラビット錠500mg	△	多めの水で洗浄
クラマール錠25mg	△	マクロゴール6000含有 苦味
クラリストライシロップ 10%小児用 (100mg/g)	○	
クラリス錠200	○	苦味
クラリス錠50小児用	○	
クラリチン錠イタブ錠10mg	○	
クラリチン錠10mg	○	
克蘭ダキシン錠50	○	多めの水で洗浄 胃痙は閉塞
クリアナル錠200mg	△	10分以上で○
クリアナル内用液8%(80mg/ml)	○	
クリアミン配合錠A1.0	×	有核錠
クリチロン配合錠	△	主薬に特異な味
クリヘック錠100mg	○	被爆注意
クリミクロン錠40mg	○	
クルコハイ錠100mg	○	
クルコハイ錠50mg	○	
クルコンサンK細粒4mEq/g カリウム(1g/包)	○	わずかな苦味
クルファスト錠10mg	○	
クレステイン細粒(1g/包)	○	
クレストール錠2.5mg	×	遮光保存 直前粉碎
クレマジンカプセル200mg	△	脱カプセル、混合しながら
クレマジン細粒分包2g	○	通過性悪く混合しながら注入
クロミッド錠50mg	○	
クロロマイセチン錠250 250mg	○	
ケイツーシロップ0.2%(2mg/ml)	○	
ケタスカプセル10mg	×	マクロゴール6000含有 シリンジから出ない
ケフラルカプセル250mg	○	
ケフラル細粒小児用(100mg/g)	○	甘く、わずかに苦味
ケルナックカプセル80mg	○	
コトドール錠10mg	○	
コスハノン錠80mg	○	マクロゴール6000含有 苦味
コテイオ配合錠EX	○	
コテイオ配合錠MD	○	
コテイソリン酸塩散1%「タナハ」(10mg/g)	○	
コニール錠4	○	マクロゴール6000含有
コハシル錠2mg	○	
コハシル錠4mg	○	
コヘカス錠200mg	△	粉碎後可
コムタン錠100mg	○	
コンチール配合顆粒(1g/包)	○	洗浄やや多めに
コルトリン錠12.5mg	○	苦味
コルヒチン錠0.5mg「タタ」	○	
コレハイン錠500mg	○	
コンスタン0.4mg錠	×	データなし
コントミン糖衣錠12.5mg	△	
コントミン糖衣錠25mg	△	粉碎後可
サークレチンS錠25	×	熱で失活
サミアオン錠5mg	△	先に不安定
サイザル錠5mg	○	
サイトテック錠200	○	
サイホックス錠600mg	○	
サイレース錠2mg	○	
サイロリック錠100	○	マクロゴール6000含有
サインバルタカプセル20mg	×	データなし、顆粒自体も腸溶性
サジテンカプセル1mg	○	
サジテンドライシロップ0.1%(1mg/g)	○	
サルベックス錠0.5mg	○	
サムスカ錠15mg	○	
サラソヒリン錠500mg	○	口渇の訴えできない人、自発的飲水できない人は×
サリグレンカプセル30mg	○	苦味
サリグレンカプセル30mg	○	苦味
サワシリンカプセル250 250mg	○	
サワシリン細粒10% (100mg/g)	○	
サンタック錠150	△	10分以上で○
サンリスムカプセル25mg	○	苦味
サンリスムカプセル50mg	○	局麻作用 舌の痺れ感 食道腫脹
シアスターゼ	×	データなし
シアリス錠10mg	×	メーカーデータなし
シェイゾロト錠25mg	△	
シェニナック錠200mg	○	
シクホーラルカプセル10(ネオール)	○	激しく振る
シクホーラルカプセル50(ネオール)	○	8FrOK、剤皮残るため、洗浄多めに
シクマート錠5mg	○	
シクロスホリンカプセル25mg「マイラン」	○	
シゴシン散0.1%(1mg/g)	○	
シゴシン錠0.125mg	○	
シゴシン錠0.25mg	○	
シスロマックSR成人用ドライシロップ	×	メーカーデータなし。ただし、他院にて8Fr通過の報告はあり。
シスロマックカプセル小児用100mg	○	苦味
シスロマック細粒小児用10% (100mg/g)	○	苦味
シスロマック錠250mg	○	苦味
シソヘイン錠75	○	
シナル配合錠	×	パントテン酸(ビタミンB5)の分解
シナル配合顆粒(1g/包)	○	
シビテルゴット錠1mg	○	
シフルカンカプセル100mg	×	固まりとなる
シフレキサ錠2.5mg	○	
シフロキサシン錠200mg	○	
シハノール錠100mg	○	苦味
シヤスピア錠25mg	○	
シヤスピア錠50mg	○	

シュリナ錠0.5mg	×	データなし
小児用ムコソルバンDS1.5%(15mg/g)	×	チューブ閉塞の可能性
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	×	データなし
シルテック錠10	○	
シルテック錠5	○	
シレニアカフセル0.5mg	×	データなし
シングレア錠10mg	×	キビレスとして判断
シントレル錠50mg	○	苦味
シンスター錠250mg	○	マクロゴール6000含有
スターシス錠90mg	○	浮遊物あるが問題なし 強い苦味
ステープラ錠0.1mg	○	安定性試験、通過性試験のみ実施
ストロカイン錠5mg	○	口腔内しびれあり
ストロメトール錠3mg	○	沈殿物をきちんとフラッシュすること
スハカール錠40mg	○	
スビロヘント錠10μg	○	
スローケー錠600mg	×	体内動態
スロビットカフセル100mg	×	シリンジより出ない
セイブル錠50mg	△	
セキソビット錠100mg	△	多めの水で洗浄
セスタン錠3mg	○	
セチア錠10mg	○	
セテイル錠5mg	○	苦味
セネカシロップ	○	
セフアドール錠25mg	○	苦味
セフアランチン末1%(10mg/g)	○	光で変色 苦味
セフィックス錠100	○	
セフジニル錠100mg「サワイ」(セフゾン)	○	シリンジに多少付着あり
セフゾンカフセル100mg	○	
セフゾン細粒小児用10%(100mg/g)	○	
セフンイー・P配合カフセル	×	シリンジより出ない。体内動態
セララ錠50mg	○	25mgは粉碎後可
セルシンシロップ0.1%(1mg/ml)	○	錠剤粉碎がベター
セルテクトライシロップ2%(20mg/g)	○	
セルテクト錠30 30mg	○	
セルヘックスカフセル50mg	○	
セルヘックス細粒10%0.5g	○	
セレキニン錠100mg	×	経管投与ハンドブックにて不可
セレクトール錠200mg	△	10分以上で○、マクロゴール6000含有
セレコックス錠100mg	△	
セレストOD錠5mg	○	
セレスタミン配合錠	○	苦味
セレナル錠10	○	
セレニカR錠200mg	×	徐放性
セレニカR錠400mg	×	粒子大、投与不可能
セレニカR顆粒40%(400mg/g)	×	徐放性顆粒 粒子大きい
セレネース錠0.75mg	○	
ゼロータ錠300	×	
ゼロクエル100mg錠	○	
ゼロクエル25mg錠	○	
ゼロクアル錠10mg	×	データなし ハンドブックでも25mgは×
ゼロケン錠20mg	○	
ゾーミックRM錠2.5mg	○	口腔内速溶錠のため
ゾーミック錠2.5mg	×	データなし
ゾピラックス錠200	○	苦味
ゾピラックス顆粒40%(400mg/g)	○	苦味
ゾファイア配合錠	○	
ゾナックス0.4mg錠	○	
ゾランタール錠100mg	△	きわめて苦い
ゾリターT配合顆粒3号 4g	○	
タイアト錠60mg	○	苦い
タイアモックス錠250mg	○	
タイトロネル錠200	△	とけ残りあり。きちんと粉碎
タカメット細粒20%(200mg/g)	○	ただし、通過性悪いとのデータあり変更が望まれる
タケプロンOD錠15	○	マクロゴール6000含有。高温注意
タケプロンカフセル15 15mg	×	腸溶性顆粒 マクロゴール6000含有 シリンジから出ない
タチオン錠50mg	○	10分以上で○。特異なにおい。吸湿性あり
タナーハ顆粒75%(750mg/包) 1g	×	シリンジに入らない
タナトル錠2.5	△	ハンドブック(5mg錠)より。
タナトル錠5	△	
タミフルカフセル75	○	
タミフルライシロップ3%(30mg/g)	○	
タランシカフセル150mg	○	
タリオン錠10mg	×	データなし
タルセバ錠150mg	○	苦味が強い。ただし、成分としては安定
タルメートカフセル15 15mg	○	
単シロップ(丸石)		矯味剤
タンリウムカフセル25mg	○	
タンニン酸アルブミンOY	○	
タンボコール錠50mg	○	苦味
チアトシカフセル10mg	○	苦味強い
チウラジール錠50mg	○	苦味
チカソシカフセル10	○	エトレチナートであり被曝注意
チャンピックス錠1mg	×	
チョコラA錠1万単位	×	光、湿度の影響
チラーチンS錠100 100μg	△	長期間放置する場合は簡易懸濁法○(粉碎なし)
チラーチンS錠25 25μg	△	長めの懸濁で○(粉碎なし)
チラーチンS錠50 50μg	△	時間を長くすれば粉碎せずに可
チラーチン末	○	
ツインランNF配合経腸用液AB400ml		経腸溶液
ツムラきゅうり湯文湯エキス顆粒(医療用)	○	
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	○	
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)3g	○	
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)3g	○	
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ麥門冬湯エキス顆粒(医療用)3g	○	
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)2.5g	○	
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒2.5g	○	
ティーエスワン配合カプセルT20 20mg(テカプ)	○	被ばく注意。大鷗薬品ホームページ参照
ティーエスワン配合カプセルT25 25mg(テカプ)	○	被ばく注意。大鷗薬品ホームページ参照
ティーエスワン配合顆粒T20	○	被ばく注意。大鷗薬品ホームページ参照
ティーエスワン配合顆粒T25	○	被ばく注意。大鷗薬品ホームページ参照
ディオハン錠40mg	○	
ディオハン錠80mg	○	
ティナゲト錠1mg	○	
テオートルラインロップ20%(200mg/g)	○	
テオロン錠100mg	○	崩壊時間短く、シリンジの先に詰まりやすい
テオロン錠200mg	○	崩壊時間短く、シリンジの先に詰まりやすい
テオロン錠50mg	○	崩壊時間短く、シリンジの先に詰まりやすい
テカトロンエリキシル0.01%(0.1mg/ml)	○	
テカトロン錠0.5mg	○	
テクレートル細粒50%(500mg/g)	○	
テクレートル錠100mg	○	
テクレートル錠200mg	○	
テシフル錠1mg	○	苦味、経管投与ハンドブックより
デンジレル錠25	△	
デタトールR錠3mg	×	体内動態。マクロゴール6000含有
デトラスト錠10mg	○	マクロゴール6000含有
デトルシールカプセル2mg	×	通過しない
デノミン錠25	○	苦味
デノミン錠50	○	苦味
デハケンR錠100	×	
デハケンR錠200	×	徐放性
デハケンシロップ5%(50mg/ml)	○	
デハケン細粒40%(400mg/g)	×	
デハケン錠100	×	
デハス細粒1%(10mg/g)	○	
デハス錠0.5mg	○	
デフロメル錠25	△	マクロゴール6000含有
デモダールカプセル100mg	○	被曝性あり アルカリ性条件下で溶解性上昇
デモダールカプセル20mg	○	被曝性あり アルカリ性条件下で溶解性上昇
デュファストン錠5mg	○	苦味
テラナス錠5	○	
テルネリン錠1mg	○	
テルハンスDS20%(200mg/g)	○	
テルロン錠0.5 0.5mg	○	
ドクマチール錠50mg	○	粉末が混ざり合わないため洗浄多め

トハストン散98.5%	○	
トピナ錠50mg	○	
トプアOD錠100mg	○	
トフニール錠10mg	×	砕いた形のまま溶け残る
トミロン錠100	○	苦味
トメタン錠200mg	×	光に不安定。苦味
トラール錠15	○	
トラクリア(62.5)	○	粉碎可、フラッシュをしっかりとすること
トラベルミン配合錠	△	マクロゴール6000含有 苦味 舌のしびれ感
トラマルカフセル25mg	○	
トラムセット配合錠	×	メーカーデータなし、メーカーより、苦味が強いいためフィルムコーティングをしている
トラシロン錠7.5mg	○	マクロゴール6000含有
トランサミンカフセル250mg	○	苦味
トランサミン錠250mg	○	苦味
トランテート錠50mg	○	苦味
トリクロリールシロップ10%(100mg/ml)	○	温度注意。高温で着色
トリノシン顆粒10%(100mg/g)1g	×	通過性悪い
トリプタール錠10 10mg	○	苦味 麻痺性
トルナー錠20 μg	○	マクロゴール6000含有。吸湿性あり。
トレランG液75g 225mL	○	
トレドミン錠25mg	○	
トレリーフ錠25mg	○	
ナイキサン錠100mg	○	
ノウセリンOD錠10 10mg	○	
ノウセリン錠10	○	現在OD錠
ナトリックス錠1 1mg	△	10分で溶解、メーカー情報、8Fr、可
ナバ(アセトアミノフェン)	○	
ニトロールRカプセル20mg	×	体内動態
ニトロール錠5mg	○	
ニトロベン舌下錠0.3mg	×	
ニハシール錠4mg	○	
ニューロタン錠25mg	△	苦味
ニューロタン錠50mg	△	苦味
ネオラル10mgカプセル	○	透明油状の液
ネオラル25mgカプセル	○	
ネオフリン錠100mg	○	
ネキシウムカプセル20mg	○	高温で固まる可能性あり。
ネシーナ錠12.5mg	○	
ノエルカフセル200mg	○	マクロゴール6000含有
ノキシン錠10mg	○	光に不安定
ノイチームシロップ0.5%(5mg/ml)	△	甘い
ノイチーム錠90mg	△	10分で溶解。甘い
ノイロトピン錠4単位	×	辛味
ノイロピタン配合錠	△	マクロゴール6000含有 苦味
ノバミン錠5mg	○	マクロゴール6000含有
ノルハスクOD錠 2.5mg	○	
ノルハスクOD錠 5mg	○	
ノルハスクOD錠10mg	○	
ノルハスク錠5mg	○	
ノルバテックス錠10mg(乳癌治療薬)	○	
ノルレボ錠0.75	×	
ノーフジヨキシンKY錠0.125 0.125mg	○	
ノードレル錠2.5mg	×	
ノイアグラ錠50mg	×	
ノバイスピリン錠100mg	△	経管投与ハンドブックでは不可。腸溶錠。胃腸障害注意。
ノイチオール錠40	×	データーなし
ノイヘン錠200mg	○	苦味
ノイミカート錠5mg	○	光に不安定。遮光
ノキシルCR錠12.5mg	×	
ノキシルCR錠25mg	×	
ノキシル錠10mg	○	多めの水で洗浄
ノクタ配合錠	○	苦味
ノッカ水「ORY」	×	データーなし
ノッカ油	×	データーなし
ノックフォール錠10	○	マクロゴール6000含有。苦味
ノナルジン錠100mg	△	マクロゴール6000含有 苦味 刺激性
ノナン錠100mg	○	苦味
ノファリン配合錠A81 81mg	○	
ノラクルート錠0.5mg	○	
ノラフロスト配合カプセル	○	
ノラミチンカプセル300mg	△	脱カブでOK
ノラリス錠5mg	○	苦味
ノリエット錠10mg	×	固化する。他薬へ変更
ノリゲンHD400g		造影剤
ノリトッパ120 200ml		造影剤
ノルシオン0.25mg錠	○	
ノルトレックス顆粒50%(500mg/g)	×	苦味を抑えるコーティングがチューブを閉塞する恐れがある
ノルトレックス錠500	×	粉碎してもとけ残る
ノルナルD錠0.1mg	○	
ノルナルD錠0.2mg	○	
ノレシヨテンファン	○	
ノロス発泡顆粒5g	×	水に触れると発泡
ノロチン錠10mg	×	
ノルソホリン錠200	△	マクロゴール6000含有。苦味。
ノントシン散20%(200mg/g)	×	
ノントシン錠100	×	マクロゴール6000含有
ノックフロール錠0.125mg	○	
ノックフロール錠0.5mg	○	
ノイカート錠20mg	×	徐放性
ノイオン散0.2%「フー」(2mg/g)	○	
ノイフェルミンR散	○	長時間放置後耐性菌数低下あり、注意
ノイフェルミンR錠	△	
ノイフェルミン錠剤	○	
ノイフェルミン配合散	○	

ビクシリンカプセル250mg	○	
ビシクリン配合錠	○	
ビスロン錠5 5mg	○	
ビソルボン錠4mg	○	
ビタノリンカプセル50	○	最少12Fr ゆっくり注入
ビタメジン配合カプセルB25	○	味なし
ビダントールF配合錠	○	
ビツサン	○	多めの水でフラッシュするとよい
ビトキサル錠10mg	△	
ビブラマイジン錠100mg	△	苦味
ビモールカプセル100mg	○	苦味
ビモヘンタン錠1.25mg「TE」(アカルティ)	○	
ビラマイト 原末	○	わずかに苦味
ビレスパ錠200mg	○	
ファミル錠250mg	×	データなし
ファミル錠200mg	×	
アイフェド錠200mg	△	
フェアストン錠40	○	被爆注意
フェアストン錠60 60mg	○	被曝注意
フェノール錠30mg	○	苦味
フェブリク10mg	○	
フェブリク錠20mg	○	
フェマール錠2.5mg	×	沈殿物残る
フェルムカプセル100mg 鉄100mg	×	徐放性
フェロ-グラテュメット錠105mg	×	体内動態
フェロミア錠50mg	○	マクロゴール6000含有 鉄味(酸味)
フェイハン錠100mg	○	苦味
フェリアミン錠 5mg	○	
フスコデ配合シロップ	×	データなし
フスコハン錠10mg	○	マクロゴール6000含有 苦味
フテラジン錠30mg	×	メーカーデータなし
フラキサキサカプセル110mg	×	
フラキサキサカプセル75mg	×	
フラジール内服錠250mg	△	ハンドブックでは不可 苦味 なるべく細かく
フラタロン錠200mg	○	苦味
フラノバル配合錠	○	マクロゴール6000含有
フラビタン錠10mg	×	腸溶性
フラビックス錠25mg	△	
フラビックス錠75mg	△	
フラトル錠20mg	×	徐放性
フリバスOD錠75mg	○	
フリバス錠25mg	○	
フリミン細粒99.5%大日本	○	
フリミン錠250mg「日医工」	○	
フリンヘラン錠5	○	マクロゴール6000含有 やや苦味
フルイトラン錠2mg	○	
フルカムカプセル27mg	○	
フルスマリンAトライシロップ 小児用1.5%(15m	○	
フルセニド錠12mg	×	
フルツロカプセル200	○	被爆注意
フルフェン錠100	○	マクロゴール6000含有 刺激味 苦味
フレタルOD錠100mg	○	
フレタルOD錠50mg	○	
フレタル散20%(200mg/g)	○	
フレティン錠25	○	少し残るがフラッシュで通過
フレトニゾロン錠「タケタ」5mg	○	
フレトニゾロン錠1mg(旭化成)	○	
フレマリジン錠0.625mg	×	
フレミネット配合錠	△	10分以上で○
フレラン1mg錠	○	多めの水で洗浄
フロクラファカプセル0.5mg	○	
フロクラファカプセル1mg	○	
フロサイリン錠20	○	マクロゴール6000含有
フロスターL錠50mg	×	徐放性
フロスター錠25	○	
フロセキソール錠0.5mg	△	
フロチンシロップ3.3%	×	メーカーデータなし
プロテカジンOD(10)	○	
プロチカジン錠10	○	マクロゴール6000含有 わずかに苦味
プロノン錠150mg	○	苦味
プロフレス錠12 12mg	○	マクロゴール6000含有
プロフレス錠2 2mg	○	マクロゴール6000含有
プロフレス錠4	○	マクロゴール6000含有
プロフレス錠8 8mg	○	マクロゴール6000含有
プロベシア錠1mg	×	メーカーデータなし
プロハール配合錠	×	
プロハラ錠2.5mg	○	被爆注意
プロハール顆粒8%(80mg/g)	×	メーカーデータなし
プロマックD錠75	○	
プロモックス小児用細粒100mg(100mg/g)	○	
プロモックス錠100mg	○	
プロリトケル経口用2%5g/本	○	
プロリネフ錠0.1mg	○	
プロイスンOD錠0.2 0.2mg	○	
プロイスンOD錠0.3 0.3mg	○	
プロイスン錠0.2 0.2mg	○	
プロイスン錠0.3	○	
プロイン錠80 80mg	○	
プロケタミン-B配合錠	×	
プロサトルSR錠200mg	×	徐放性
プロシケア錠2.5mg	○	
プロシケア錠5mg	○	
プロタニス錠50mg	×	徐放性
プロネット錠17.5mg	○	

ヘネット錠2.5mg	○	
ヘネリン錠2mg	○	
ヘプセラ錠10	○	
ヘフリコール錠50mg	○	マクロゴール6000含有 温度に安定 苦味
ヘミラスト錠10mg	○	上記参照
ヘミラスト錠5mg	○	成分であるペミロラストKの簡易濁は○
ヘモロンカプセル200mg	×	
ヘラサスLA錠60μg	×	徐放性
ヘリアクチン散1%(10mg/g)	×	データなし
ヘリアクチンシロップ0.04%	○	
ヘリアクチン錠4mg	○	
ヘリチーム配合顆粒	×	マクロゴール6000含有 シリンジに入らない
ヘルサン錠25mg	○	マクロゴール6000含有
ヘルジヒンLAカプセル20mg	○	ゆっくり注入
ヘルジヒン錠20mg	○	
ヘルベッサーRカプセル100mg	×	徐放性
ヘルベッサー錠30	×	徐放性
ヘルマックス錠250μg	○	
ヘロテック錠2.5mg	○	
ベンコール配合錠	△	洗浄多めに
ベンザリン錠5	○	
ベンタサ錠250mg	×	放出調整薬剤 体内動態
ベンタサ錠500mg	×	溶解せず
ベンタジン錠25	○	
ベーステル内用液10	○	
ベリン錠1mg	×	データなし
ボスミンドライシロップ400(400mg)	○	
ボスミン錠500	○	
ボナロン錠35mg	○	
ボナロン錠5mg	○	
ボノテオ錠1mg	×	メーカーデータなし
ボノテオ錠50mg	○	ビーカーに固直(粉)、10分以上放置
ボモクミン錠10mg	△	苦味
ボラキス錠2.2mg	○	
ボラキス錠3.3mg	○	
ボラミンシロップ0.04%(0.4mg/ml)	○	
ボラミンドライシロップ0.2%(2mg/g)	×	メーカーデータなし
ボラミン錠2mg	○	苦味
ボリフル錠500mg	○	マクロゴール6000含有 よく振りながら注入
ボルトレンSRカプセル37.5mg	○	注入速度遅くすれば通過
ボルトレン錠25mg	△	
ボルトラック原末6g/包	○	甘い
ボソゾール錠100mg	○	
ボソターカプセル250mg	×	懸濁性非常に悪く、粉末状に残る
ボソターシロップ3.25%(32.5mg/ml)	○	
マースレンS配合顆粒	○	
マーベロン28	×	
マロックス懸濁用配合顆粒(1.2g/包)	○	
マイスタン錠5mg(抗てんかん剤)	○	
マイスリー錠10mg(入眠剤)	○	マクロゴール6000含有 苦味
マイスリー錠5mg(入眠剤)	○	
マイテラーセ錠10mg	○	50℃以上で分解 少し残るがフラッシュでOK 苦味
マクスルトRPD錠10mg	×	データなし、他施設にて使用報告はある
マクミト錠330mg	○	
マクラックス錠250mg	○	
マクラックス錠330mg	○	
マクロゴール250ml	○	
マクロゴールP50g	○	
マツウラ麦門冬湯エキス顆粒2.5g	○	
マドハー配合錠	○	
マルツエキス分包(和光堂)9g/包	×	メーカーデータなし
ミオナル錠50mg	△	マクロゴール6000含有 苦味
ミカムロ配合錠AP	○	2時間まで安定
ミカルデイス錠20mg	△	
ミカルデイス錠40mg	△	
ミグリス錠5mg	○	
ミケラシLAカプセル15mg	×	徐放性、メーカーデータなし
ミコンビ配合錠AP	○	
ミコンビ配合錠BP	×	
ミノフレシ錠0.5mg	○	
ミノマイシン錠100mg	○	
ミノマイシン錠50mg	△	
ミノマイシン顆粒2%(20mg/g)	△	
ミヤBM錠	○	
ミラベックスLA錠0.375mg	×	徐放性
ミラベックスLA錠1.5mg	×	徐放性
ミンクリア内用散布液0.8%20ml	○	
ムーベン配合内用剤	○	メーカーは動めていないが、他院で胃瘻投与のデータあり。経口と同じようにゆっくり
ムコスタ錠100mg	○	
ムコソルバンカプセル45mg	×	徐放性
ムコソルバン錠15mg	○	
ムコソルバン内用液0.75%(7.5mg/ml)	○	
ムコダインシロップ5%(50mg/ml)	○	
ムコダイン細粒50%(500mg/g)	○	洗浄やや多めに
ムコダイン錠250mg	○	
マイアトMS小児用細粒10%(100mg/g)	○	苦味
マイアトMS錠100mg	○	
マイラックス錠1mg	○	
マイラックス錠2mg	○	
メインテート錠0.625	△	データなし、経管投与ハンドブック(2.5mg)参照
メインテート錠2.5	△	
メインテート錠5	△	
メキシチールカプセル100mg	○	苦味
メキシチールカプセル50mg	○	苦味

メサフィン配合散(1g/包)	×	データなし、沈殿物多い、5Fr×
メシコン錠15mg	○	
メスチン錠60mg	○	
メソレキセート錠2.5mg	×	
メタルカプターセカフセル100mg	○	特異臭 不快な味
メチエフ錠10%(100mg/g)	○	
メチコハール細粒0.1% 500μg/包	○	
メチコハール錠500μg	○	マクロゴール6000含有
メチルエルコトリン錠0.125mg「あすか」	○	
メテツ錠250mg	○	
メグルコ錠250mg	×	データなし
メトリン錠2mg	○	
メレート錠2mg	×	データ、使用報告なし
メネット配合錠100	○	
メネット配合錠250	○	
メハロチン錠10	○	
メハロチン錠5 5mg	○	苦味
メファキン「ヒサミツ」錠275	△	安全性通過試験なし。
メフチン錠25μg	○	
メフチン錠50μg	○	
メマリ錠20mg	○	
メマリ錠5mg	○	
メスロン錠6mg	○	苦味
メルカゾール錠5mg	×	
モセック錠10mg	△	
モース配合錠	×	データなし、使用実績なし
薬用炭「日医工」	○	
ユーエフエ配合顆粒T100 100mg(テカフ)	○	被爆注意
ユーエフエ配合顆粒T150 150mg(テカフ)	○	被爆注意
ユーセル錠25mg	○	
ユービット錠100mg	○	マクロゴール6000含有
ユーロシン2mg錠	○	苦味
ユニシア配合錠HD	○	
ユニシア配合錠LD	○	10分で溶解、メーカー情報、8Fr、可
ユニフィルA錠400mg	×	徐放性
ユベランカプセル100mg	○	軟カプセルの残りが残る
ユベラ錠50mg	×	マクロゴール6000含有
ユリーフ錠4mg	○	
ユリノム錠25mg	○	
ユリノム錠50mg	○	
ヨウ化カリウム	○	
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	×	チューブを通過しない
ラクソベロン錠2.5mg	○	
ラクソベロン内用液0.75%(10ml/本)	○	
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	○	
ラコールNF配合経腸用液	○	
ラシックス錠20mg	○	
ラシックス錠40mg	○	
ラシレス錠150mg	×	
ラスピリン錠1mg	×	データなし
ラックビー微粒N 1%	○	
ラックビー微粒N(1g/包)1g	○	わずかに甘味苦味
ラニラビド錠0.1mg	○	
ラミクター錠100mg	○	
ラミクター錠25mg	○	
ラミシール錠125mg	○	
ラミテクト錠125mg	○	
ランサップ400	×	
ランサップ800	×	タケブロンはOD錠
リーゼ錠5mg	○	
リーハ「外」配合顆粒 4.15g	×	コーティング顆粒 わずかな苦味
リウマトレックスカプセル2mg	○	被ばく注意
リクシアナ錠15mg	○	
リクシアナ錠30mg	○	
リザヘンカプセル100mg	○	
リスハダール錠1mg	○	マクロゴール6000含有 苦味
リスハダール錠2mg	○	マクロゴール6000含有、苦味
リスハダール錠3mg	○	経管投与ハンドブックには1mg、2mgあり
リスハダール内用液0.5ml(1mg/mL)	○	使用報告あり
リスミン錠2mg	○	
リスミック錠10mg	○	苦味
リスモタンR錠150mg	×	体内動態の問題
リスモタンカプセル100mg	○	
リスモタンカプセル50mg	○	
リドニア錠3mg	○	苦味
リハロ錠1mg	○	
リハロ錠2mg	○	メーカー情報
リビテイルカプセル100	○	
リビテイル錠80mg	○	
リビテイル錠10mg	○	苦味
リビテイル錠5mg	○	
リファジンカプセル150mg	○	
リフレックス錠15mg	○	3錠3.5Frで抵抗性あり
リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	○	洗浄やや多めに
リボトリール錠0.5mg	○	
リボハス錠5	○	
リマシル錠50mg	×	データなし
リリカカプセル25mg	○	
リリカカプセル75mg	○	
リルテック錠50	△	マクロゴール6000含有、苦味
リンデロン錠0.5mg	○	
リンラキサー錠125mg	○	
リン酸コデイン錠5mg「マイラン」	○	
ルジオミール錠10mg	○	苦味

